

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 158
du 19 Octobre 1989

AGRUMES

Les cératites sont toujours présentes dans les vergers de clémentiniers, mais également d'orangers et de pomelos. Les clémentines " tournantes " sont très exposées aux piqures.

-> Dans les vergers ayant déjà reçu ou deux traitements de bordure avec insecticide + attractif, la population est assez faible. Ce type de traitement aura toutefois intérêt à être renouvelé en fonction de la remanence des produits.

-> Dans les vergers non traités jusqu'à maintenant, les populations deviennent abondantes et il est urgent d'effectuer un traitement généralisé avec du diméthoate ou de formothion, ou malathion, ou trichlorfon.

ARBRES FRUITIERS

Pendant la chute des feuilles, il est prudent de réaliser des traitements d'automne.

**** fusicoccum du pêcher et du nectarinier**

Selon l'importance et la fréquence des pluies, effectuez un à trois traitements dans les parcelles atteintes avec les produits suivants :

benomyl	50 g ma/hl	BENLATE
carbendazyme	50 g ma/hl	NS
thiophanate méthyl	120 g ma/hl	PELT 44

**** coryneum, cloque et bactériose des arbres fruitiers à noyau**

Préférez une spécialité à base de cuivre à raison de 250 g de cuivre métal/hl.

**** Traitez par beau temps sur bois sec et bien aouté ****

(C) SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

P 76